



מדריך לחיפוש

Cochrane Library

תוכן עניינים

3	אודות ארגון Cochrane
3	רפואה מבוססת ראיות
3	מחקרים אקראיים מבוקרים
4	סקירות שיטתיות
4	מטה אנליזה
5	Cochrane Library
5	אפשרויות חיפוש
6	דפדוף באמצעות ה- Browse
7	חיפוש פשוט ב- Search
7	חיפוש מתקדם Advanced
8	חיפוש באמצעות ה- MeSH
9	צפייה בתוצאות חיפוש
12	סימון תוצאות החיפוש ושמירתן
13	חיפוש מורכב באמצעות ה- Search Manager

אודות ארגון ה-Cochrane

ארגון ה-Cochrane הינו ארגון עצמאי ללא כוונות רווח, המורכב מלמעלה מ-37,00 אלף מתנדבים מ-130 מדינות.

מטרתו - לארגן מידע מתוך מחקר רפואי באופן שיטתי, על מנת לאפשר לסגל רפואי, חולים וקובעי מדיניות לקבל החלטות על בסיס עקרונות **רפואה מבוססת ראיות (Evidence Based Medicine)**.

הארגון מורכב מקבוצות עניין (Review Groups) בתחומי בריאות שונים (למשל היריון ולידה, מחלות מדבקות, בריאות הציבור וכו'), אשר יוצרות **סקירות שיטתיות (Systematic Reviews)** אודות התערבויות רפואיות ובדיקות אבחון.

רפואה מבוססת ראיות

רפואה מבוססת ראיות מוגדרת כשימוש מצפוני, מפורש ושקול, בראיות המחקריות העדכניות והטובות ביותר, בעת קבלת החלטות הנוגעות לטיפול בחולה. זאת בניגוד להחלטות המתקבלות על פי ניסיון קליני ואינטואיציה רפואית הנסמכים על תצפיות.

רפואה מבוססת ראיות מסתמכת על **מחקרים אקראיים מבוקרים (Randomized Controlled Trials)**.

מחקרים אקראיים מבוקרים

מחקרים אקראיים מבוקרים הם מחקרים מדעיים (על פי רוב רפואיים) בהם הנחקרים נבחרים באופן אקראי לקבוצה/ות ההתערבות המחקרית (לאחר שנבדקו ועמדו בקריטריוני הכללה מסוימים). שיטת מחקר זו רצויה כאשר רוצים לבחון יעילות של התערבות רפואית ולספק מידע לגבי תופעות הלוואי שלה.

להלן דוגמא לחלוקה אקראית של חולים במחקר אקראי מבוקר:




Fig. 1. Flow diagram of persons assessed for eligibility, enrolled in the study, allocated to the AGE or placebo and statistically analyzed.

סקירות שיטתיות

סקירה שיטתית הינה שיטה יסודית, מקיפה וברורה לבחינת ספרות רפואית. היא מבוססת על ניתוח של מחקרים אקראיים מבוקרים וכוללת מספר שלבים:

1. קבוצת עניין בוחרת התערבות מסוימת למחלה או בעיה אחרת בתחום הבריאות וקובעת אם התערבות זו פועלת או לא. למשל:

האם שימוש בשום יעיל למניעה ו/או טיפול בצינון?

2. הקבוצה מחפשת מחקרים אקראיים מבוקרים שנעשו בתחום, במאגרי מידע שונים, על פי קריטריוני חיפוש מוגדרים.

3. המחקרים שנמצאו עוברים בחינת איכות מדוקדקת ולאחריה מחליטים אם הם יכללו בניתוח על פי קריטריונים מדוקדקים.

4. קבוצת העניין מבצעת ניתוח של מסקנות כל המחקרים ומפרסמת סקירה עם מסקנותיה.

5. עדכון הסקירות נעשה אחת לשנתיים כאשר קבוצת העניין בוחנת את הממצאים המחקריים שנאספו מאז פרסום הסקירה האחרונה.

קיימות מעל 6000 סקירות ומעל 2000 פרטוקולים (סקירות בהתהוות). חלק ניכר מהסקירות מבוססות על **Meta Analysis (מטה אנליזה)**.

מטה אנליזה

גישה סטטיסטית בה משווים ומצרפים תוצאות שהושגו בשני מחקרים או יותר לקבלת ממוצע משוקלל. שימוש במטה אנליזה מאפשר להגיע למסקנות ברורות וחד משמעיות, אך לא תמיד הדבר אפשרי.

ניתן לבצע חיפוש במאגר ספריית ה Cochrane לאיתור סקירות ופריטים אחרים.

דוגמה לתקציר של סקירה שיטתית:

Abstract	Jump to...
Background	
Garlic is alleged to have antimicrobial and antiviral properties that relieve the common cold, among other beneficial effects. There is widespread usage of garlic supplements. The common cold is associated with significant morbidity and economic consequences. On average, children have six to eight colds per year and adults have two to four.	
Objectives	
To determine whether garlic (<i>Allium sativum</i>) is effective for the prevention or treatment of the common cold, when compared to placebo, no treatment or other treatments.	
Search methods	
We searched CENTRAL (2014, Issue 7), OLDMEDLINE (1950 to 1965), MEDLINE (January 1966 to July week 5, 2014), EMBASE (1974 to August 2014) and AMED (1985 to August 2014).	
Selection criteria	
Randomised controlled trials of common cold prevention and treatment comparing garlic with placebo, no treatment or standard treatment.	
Data collection and analysis	
Two review authors independently reviewed and selected trials from searches, assessed and rated study quality and extracted relevant data.	
Main results	
In this updated review, we identified eight trials as potentially relevant from our searches. Again, only one trial met the inclusion criteria. This trial randomly assigned 146 participants to either a garlic supplement (with 180 mg of allicin content) or a placebo (once daily) for 12 weeks. The trial reported 24 occurrences of the common cold in the garlic intervention group compared with 65 in the placebo group (P value < 0.001), resulting in fewer days of illness in the garlic group compared with the placebo group (111 versus 366). The number of days to recovery from an occurrence of the common cold was similar in both groups (4.63 versus 5.63). Only one trial met the inclusion criteria, therefore limited conclusions can be drawn. The trial relied on self reported episodes of the common cold but was of reasonable quality in terms of randomisation and allocation concealment. Adverse effects included rash and odour.	
Authors' conclusions	
There is insufficient clinical trial evidence regarding the effects of garlic in preventing or treating the common cold. A single trial suggested that garlic may prevent occurrences of the common cold but more studies are needed to validate this finding. Claims of effectiveness appear to rely largely on poor-quality evidence.	

Cochrane Library

הספריה מכילה שישה מאגרי מידע:


1. **Cochrane Database of Systematic Reviews** – מאגר הסקירות השיטתיות.
2. **(DARE) Database of Abstracts of Review of Effects** – מאגר המכיל תקצירים של סקירות שיטתיות ממקורות אחרים שעברו הערכה של רמת האיכות. לכל תקציר נוספה פרשנות המדווחת על איכות הסקירה.
3. **(CENTRAL) Cochrane Central Register of Controlled Trials** – מאגר המכיל מידע אודות מחקרים קליניים מבוקרים. המידע נלקח ממאגרים ביבליוגרפיים ומקורות אחרים.
4. **The Cochrane Methodology Register** – מאגר ביבליוגרפי של פרסומים המדווחים על שיטות שנעשה בהן שימוש במחקרים קליניים מבוקרים ומחקרים מתודולוגיים כלליים. עשוי להיות רלוונטי לכל מי שמכין סקירה שיטתית.
5. **Health Technology Assessment Database** – מידע בנוגע להערכות של טכנולוגיות בריאות. מחקרים אודות ההשלכות הרפואיות, החברתיות, האתיות והכלכליות של התערבויות בריאותיות מרחבי העולם.
6. **The NHS Economic Evaluation Database** – הערכות כלכליות מרחבי העולם. מוצגת הערכת איכות המחקרים.

אפשרויות החיפוש


- לאחר בחירת המאגר מדף מאגרי המידע של הספרייה, יש להקיש על **Advanced Search** בחלק הימני עליון של המסך :




- יופיע המסך הבא. לפנינו מספר אפשרויות חיפוש :



דפדוף באמצעות Browse



חיפוש פשוט ב- Search




1. בתיבת החיפוש מקלידים את מילות/מונחי החיפוש. המערכת תציע אפשרויות באופן אוטומטי בעת הקלדת מונחי החיפוש. יש להשתמש במילות חיבור (AND, OR, NOT).

2. מקישים על **Go**


אופן צפייה בתוצאות החיפוש, בחירת התוצאות ושמירתן יפורט בהמשך.

חיפוש מתקדם Advanced

לחיצה עם העכבר על  תוסיף שורת חיפוש (ניתן להוסיף עד ארבע שורות):



יש להשתמש בתיבות החיפוש לשם יצירת שאילתה:



3. בחירת אופן ההצלבה בין השדות
AND – שני המונחים חייבים להופיע ברשומה
OR – אחד המונחים חייב להופיע ברשומה
NOT – המונח הראשון יופיע והמונח השני לא יופיע.

4. לשם ביצוע החיפוש יש להקיש על **Go**

אופן צפייה בתוצאות החיפוש, בחירת התוצאות ושמירתן יפורט בהמשך.

חיפוש באמצעות MeSH

1. הקלדת הנושא לחיפוש במילון המבווקר למונחים רפואיים

2. ניתן להוסיף תאריכים (תת נושאים) במידת הצורך

3. לשם ביצוע החיפוש יש להקיש על

1. המערכת מציגה את הנושא המתאים או הקרוב ביותר למונח שהוקלד וכן, נושאים רלוונטיים נוספים.

2. ניתן לצמצם את תוצאות החיפוש לנושא המדויק, על ידי סימון האפשרות:
Single MeSH term (unexploded)

3. המערכת מציגה את תוצאות החיפוש לפי ששת מאגרי Cochrane Library. ניתן לצפות בכל התוצאות, לשמור את החיפוש וכן, להוסיף אותו לחיפוש המורכב.

צפייה בתוצאות חיפוש

מתקבל מסך תוצאות החיפוש:

View Results

לאחר שהקשנו על

2. ניתן לסנן את תוצאות
החיפוש לפי כל אחד
מששת מאגרי
Cochrane Library

1. ניתן לצפות בתוצאות
החיפוש לפי רלוונטיות,
סדר א-ב ותאריך פרסום

Cochrane Database of Systematic Reviews : Issue 10 of 12, October 2015

Issue **updated daily** throughout month

There are **26** results from **9111** records for your search on "MeSH descriptor: [Kidney Diseases] explode all trees and with qualifier(s): [Prevention & control - PC] in Cochrane Reviews"

Pages **1 - 25** | **26 - 26**

Sort by Relevance: high to low

Select all | Export all | Export selected

Interventions for preventing and treating kidney disease in Henoch-Schönlein Purpura (HSP)
Deirdre Hahn , Elisabeth M Hodson , Narelle S Willis and Jonathan C Craig
Online Publication Date: August 2015

Angiotensin converting enzyme inhibitors in normotensive diabetic patients with microalbuminuria
Howard G Lovell
Online Publication Date: January 2006

Interventions for covert bacteriuria in children
Anita Fitzgerald , Rintaro Mori and Monica Lakhanpaul
Online Publication Date: February 2012

Interventions for renal vasculitis in adults
Giles Walters , Narelle S Willis and Jonathan C Craig
Online Publication Date: September 2015

Dietary interventions for preventing complications in idiopathic hypercalciuria
Joaquin Escribano , Albert Balaguer , Marta Roguè i Figuls , Albert Feliu and Natalia Ferre
Online Publication Date: February 2014

Preoperative statin therapy for patients undergoing cardiac surgery
Elmar W Kuhn , Ingo Slottosch , Thorsten Wahlers and Oliver J Liakopoulos
Online Publication Date: August 2015

Altered dietary salt intake for preventing and treating diabetic kidney disease
Rebecca J Suckling , Feng J He and Graham A MacGregor
Online Publication Date: December 2010

All Results (1085)

- Cochrane Reviews (26)
 - All
 - Review
 - Protocol
- Other Reviews (89)
- Trials (921)
- Methods Studies (0)
- Technology Assessments (3)
- Economic Evaluations (46)
- Cochrane Groups (0)

All

Current Issue

Me Methodology

Dx Diagnostic

Ov Overview

Pg Prognosis

Qu Qualitative

Cc Conclusions changed

Ns New search

Mc Major change

Up Update

Wd Withdrawn

Cm Comment

3. תגיות המציינות את
הסטטוס שניתן לסקירה
או לפרוטוקול
(של Cochrane בלבד).
הסבר לגבי המקרא
מופיע בעמוד הבא

4. בהקשה על שם
הסקירה השיטתית
ייפתח עמוד עם מידע
מקיף על הסקירה

מקרא התגיות של סקירות שיטתיות ופרוטוקולים של Collaboration Cochrane :

Review	A full review, complete with results and discussion, possibly including meta-analyses to combine results across studies.
Protocol	The outline of a review in preparation, including the background, rationale and methods.
Methodology	A full-text systematic review of methodological studies.
Diagnostic	A full-text systematic review of studies assessing accuracy of diagnostic tests.
Overview	An overview of multiple Cochrane intervention reviews addressing the effects of two or more potential interventions for a single condition or health problem.
New	A new protocol or review that has been published in the most recent issue.
Conclusions changed	There has been an important change to the conclusions of the review published in the most recent issue.
New search	A new search for studies has been conducted for an existing review as published in the most recent issue.
Major change	The protocol has been amended to reflect a change in scope published in the most recent issue.
Withdrawn	The review or protocol has been withdrawn, which may be because it was considered to be out of date. Reasons for withdrawal are specified in the document.
Comment	The review includes comments. Readers can submit comments, which are incorporated into the review together with answers and feedback from the review authors.

לאחר שהקשנו על שם הסקירה השיטתית מתקבל המסך הבא :

1. מידע ביבליוגרפי אודות הסקירה וקישורים למידע נוסף (כיצד לצטט, מידע אודות מחברים, טבלאות, איורים וכו')

3. הסימן מסמל כי קיימת גישה מלאה לסקירה השיטתית באמצעות הספרייה

2. אפשרויות לפתיחת הטקסט המלא של הסקירה השיטתית בפורמטים שונים (תקציר, סטנדרטי ומלא)

Intervention Review

Altered dietary salt intake for preventing and treating diabetic kidney disease

Rebecca J Suckling^{1,*}, Feng J He²,
Graham A MacGregor²

Database Title: **The Cochrane Library**

Editorial Group: [Cochrane Renal Group](#)

Published Online: 8 DEC 2010

Assessed as up-to-date: 28 JAN 2010

DOI: 10.1002/14651858.CD008763.pub 2

Copyright © 2010 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.

score 16

Additional Information ([Show All](#))

[How to Cite](#) | [Author Information](#) | [Publication History](#)

SEARCH

Title, Abstract, Keywords

Search >

Medical Terms (MeSH) >

Search Manager >

ARTICLE TOOLS

Save to My Profile

Export Citation for this Article

E-mail Link to this Article

Submit Comments

Request Permissions

Share |

[Abstract](#)

[Article](#)

[Figures](#)

[Tables](#)

[References](#)

[Other Versions](#)

[Cited By](#)

[View Full Article \(HTML\)](#)

[Enhanced Article \(HTML\)](#)

[Summary \(56K\)](#)

[Standard \(456K\)](#)

[Full \(601K\)](#)

Abstract

Jump to...

Background

There is strong evidence that our current consumption of salt is a major factor for increased blood pressure (BP) and a modest reduction in salt intake lowers BP whether BP levels are normal or raised. Tight control of BP in diabetics lowers the risk of strokes, heart attacks and heart failure and slows the progression of diabetic kidney disease (DKD). Currently there is no consensus in restricting salt intake in diabetic patients.

Objectives

To evaluate the effect of altered salt intake on BP and markers of cardiovascular disease and DKD.

Search methods

In January 2010, we searched the Cochrane Renal Group's Specialised Register, CENTRAL (in *The Cochrane Library*), MEDLINE (from 1966) and EMBASE (from 1980) to identify appropriate articles.

Selection criteria

We included all randomised controlled trials of salt reduction in individuals with type 1 and type 2 diabetes.

Data collection and analysis

Two authors independently assessed studies and resolved differences by discussion with a third independent author. We calculated mean effect sizes using both the fixed-effect and random-effects models.

Main results

Thirteen studies (254 individuals) met our inclusion criteria. These included 75 individuals with type 1 diabetes and 158 individuals with type 2 diabetes. The median reduction in urinary sodium was 203 mmol/24 h (11.9 g/day) in type 1 diabetes and 125 mmol/24 h (7.3 g/day) in type 2 diabetes. The median duration of salt restriction was one week in both type 1 and type 2 diabetes. BP was reduced in both type 1 and type 2 diabetes. In type 1 diabetes (56 individuals), salt restriction reduced BP by -7.11/-3.13 mm Hg (systolic/diastolic); 95% CI: systolic BP (SBP) -9.13 to -5.10; diastolic BP (DBP) -4.28 to -1.98. In type 2 diabetes (56 individuals), salt restriction reduced BP by -6.90/-2.87 mm Hg (95% CI: SBP -9.84 to -3.95; DBP -4.39 to -1.35). There was a greater reduction in BP in normotensive patients, possibly due to a larger decrease in salt intake in this group.

Authors' conclusions

Although the studies are not extensive, this meta-analysis shows a large fall in BP with salt restriction, similar to that of single drug therapy. All diabetics should consider reducing salt intake at least to less than 5-6 g/day in keeping with current recommendations for the general population and may consider lowering salt intake to lower levels, although further studies are needed.

4. תקציר הסקירה השיטתית

סימון תוצאות החיפוש ושמירתן

ניתן לסמן את כל תוצאות החיפוש או חלקן על מנת לשמור אותן במסמך.
שימו לב! לא ניתן לייצא תוצאות לתיקיה או לדואר אלקטרוני.

1. סימון התוצאות לשמירה:
ניתן להקיש על Select all או לבחור מתוך התוצאות רק את אלו שרלוונטיות עבורנו

2. ניתן לשמור את התוצאות הנבחרות

3. ניתן לשמור את כל תוצאות החיפוש

4. לאחר בחירת אופציית השמירה תיפתח חלונית בה נבחר באיזה אופן נשמור ונקיש על Export Citation את המסמך שנוצר ניתן לשמור כקובץ

חיפוש מורכב באמצעות Search Manager

ה - Search Manager מאפשר לבצע הצלבות בין מספר רב של תוצאות חיפוש.

לפני תהליך ההצלבה, ניתן לשמור מספר תוצאות חיפוש ב- Search Manager בשני אופנים:
1. לבצע כל חיפוש בלשונית Search ולאחר כל חיפוש להוסיף את התוצאות ל- Search Manager:

חיפוש ראשון

The screenshot shows the Search Manager interface with the search term "diabetes control" entered. The "Add to Search Manager" button is highlighted with a yellow box. The results section shows 263 results from the Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 10 of 12, October 2015. The results are sorted by Relevance: high to low. The first three results are listed:

- Intensive glucose control versus conventional glucose control for type 1 diabetes mellitus**
Birgit Fullerton, Klaus Jeitler, Mirjam Seitz, Karl Horvath, Andrea Berghold and Andrea Siebenhofer
Online Publication Date: February 2014
- Oral anti-diabetic agents for women with pre-existing diabetes mellitus/impaired glucose tolerance or previous gestational diabetes mellitus**
Joanna Tieu, Suzette Coat, William Hague and Philippa Middleton
Online Publication Date: October 2010
- Different intensities of glycaemic control for pregnant women with pre-existing diabetes**
Philippa Middleton, Caroline A Crowther and Lucy Simmonds
Online Publication Date: August 2012

חיפוש שני

The screenshot shows the Search Manager interface with the search term "exercise" entered. The "Add to Search Manager" button is highlighted with a yellow box. The results section shows 531 results from the Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 10 of 12, October 2015. The results are sorted by Relevance: high to low. The first three results are listed:

- Water-based exercise training for chronic obstructive pulmonary disease**
Renae J McNamara, Zoe J McKeough, David K McKenzie and Jennifer A Alison
Online Publication Date: December 2013
- Exercise for improving balance in older people**
Tracey E Howe, Lynn Rochester, Fiona Neil, Dawn A Skelton and Claire Ballinger
Online Publication Date: November 2011
- Modes of exercise training for intermittent claudication**
Gert Jan Laurent, Farzin Fakhry, Hugo JP Folkenrood, M G Myriam Hunink, Joep AW Teijink and Sandra Spronk
Online Publication Date: July 2014

Search Search Manager Medical Terms (MeSH) Browse

+ Title, Abstract, Keywords insulin Go Save

Search Limits Search Help (Word variations have been searched) Add to Search Manager

Clear

All Results (27401)

☒ Cochrane Reviews (108)

☒ All

☐ Review

☐ Protocol

☐ Other Reviews (285)

☐ Trials (26708)

☐ Methods Studies (25)

☐ Technology Assessments (108)

☐ Economic Evaluations (167)

☐ Cochrane Groups (0)

☒ All

☐ Current Issue

Me Methodology

Dx Diagnostic

Ov Overview

Pg Prognosis

Qu Qualitative

Cc Conclusions changed

Ns New search

Mc Major change

Up Update

Cochrane Database of Systematic Reviews : Issue 10 of 12, October 2015

Issue updated daily throughout month

There are 108 results from 9112 records for your search on 'insulin in Title, Abstract, Keywords in Cochrane Reviews'

Pages 1 - 25 | 26 - 50 | 51 - 75 | 76 - 100 | 101 - 108

Sort by Relevance: high to low

Select all | Export all | Export selected

☐ Long-acting insulin analogues versus NPH insulin (human isophane insulin) for type 2 diabetes mellitus
Karl Horvath , Klaus Jeitler , Andrea Berghold , Susanne H Ebrahim , Thomas W Gratzler , Johannes Plank , Thomas Kaiser , Thomas R Pieber and Andrea Siebenhofer
Online Publication Date: April 2007

☐ Insulin detemir versus insulin glargine for type 2 diabetes mellitus
Sanne G Swinnen , Airin CR Simon , Frits Holleman , Joost B Hoekstra and J Hans DeVries
Online Publication Date: July 2011

☐ Short acting insulin analogues versus regular human insulin in patients with diabetes mellitus
Andrea Siebenhofer , Johannes Plank , Andrea Berghold , Klaus Jeitler , Karl Horvath , Markus Narath , Robert Gfrerer and Thomas R Pieber
Online Publication Date: April 2006

☐ Insulin monotherapy versus combinations of insulin with oral hypoglycaemic agents in patients with type 2 diabetes mellitus
Alex N Goudswaard , Niall J Furlong , Gerlof D Valk , Ronald P Stolk and Guy EHM Rutten
Online Publication Date: October 2004

כעת עוברים ללשונית Search Manager והחיפושים מופיעים לפי סדר וממוספרים:

Search Search Manager Medical Terms (MeSH) Browse

To search an exact word(s) use quotation marks, e.g. "hospital" finds hospital; hospital (no quotation marks) finds hospital and hospitals; pay finds paid, pays, paying, payed)

Add to top

#1 "diabetes control":ti,ab,kw (Word variations have been searched) S 661

#2 "exercise":ti,ab,kw (Word variations have been searched) S 46209

#3 insulin:ti,ab,kw (Word variations have been searched) S 27401

#4 M

Clear Strategy Search Help ☐ Highlight orphan lines

Save strategy

Strategy Name

Comments

2. לבצע את כל החיפושים בלשונית Search Manager :

בשלב הבא, ניתן לבצע את ההצלבה בין כל החיפושים :

1. בשורת החיפוש הבאה נקליד את מספרי שורות החיפוש המבוקשות, ונצליב ביניהן באמצעות AND, NOT, OR (ניתן לכתוב באותיות גדולות או קטנות)

2. ניתן לשמור את כל תוצאות החיפוש

3. לשם ביצוע החיפוש יש להקיש על Go

1. לצפייה בתוצאות
החיפוש יש להקיש על
המספר שהתקבל לאחר
ההצלה בין החיפושים

The screenshot shows the 'Search Manager' tab in a web application. At the top, there are tabs for 'Search', 'Search Manager', 'Medical Terms (MeSH)', and 'Browse'. Below the tabs, a note states: 'To search an exact word(s) use quotation marks, e.g. "hospital" finds hospital; hospital (no quotation marks) finds hospital and hospitals; pay finds paid, pays, paying, payed)'. A list of search strategies is displayed with columns for a minus/plus icon, a strategy number, the search query, a search type icon (S or M), and a result count. Strategy #4 is highlighted in yellow and contains the query '#1and #2 and #3' with a result count of 42. Below the list, there are links for 'Clear Strategy' and 'Search Help', and a checkbox for 'Highlight orphan lines'. A 'Save strategy' section contains a 'Strategy Name' field with the text 'diabetes control with exercise and insuline', a 'Comments' field with the text 'for m paper on diabetes', and a 'Save Strategy' button. A purple arrow points from the text box above to the result count '42' of strategy #4. A green arrow points from the text box below to the 'Strategy Name' field. A red arrow points from the text box below to the 'Save Strategy' button.

2. לשמירת החיפוש יש לבחור שם
ולהקלידו תחת "Strategy Name".
ניתן להוסיף הערות לגבי החיפוש
בשורת ה-Comments

3. לשמירת החיפוש יש להקיש על
Save Strategy

בהצלחה!
תחום היעץ